



Informasjon om rotbehandling ved Oslo Endodontisenter

Du er blitt henvist til oss for rotbehandling av tann.

Rotfyllingen pleier som regel å gå over 2 besøk:

På det første besøket blir nerven / den gamle rotfyllingsmassen i tannen renset ut og et antibakterielt innlegg legges inn i rotkanalene. Tannen vil så få en midlertidig fylling på toppen.

Det er viktig at du ikke tygger / spiser harde og seige ting på med denne tannen da det er en risiko for at den kan knekke.

På det andre besøket blir det det antibakterielle innlegget fjernet og tannen rotfylt. Rotfyllingen består av en sement («sealer») og et kjernemateriale av gummi (guttaperka). For å forhindre lekkasje av bakterier inn til rotfyllingen blir ny midlertidig fylling lagt inn i rotkanalene og på toppen av tannen.

Din tannlege skal erstatte den øverste delen av denne midlertidige fyllingen med en permanent fylling eller krone. Hvilken løsning som velges kan du snakke med tannlegen din om, men dersom det er mye av tannen som er borte så pleier vi å anbefale kronebehandling.

Ved en rotspissamputasjon vil man fjerne rotspissen på den / de røttene med infeksjon og legge inn en sement-propp opp i roten før man syr igjen tannkjøttet. Stingene fjernes etter ca.1 uke.

I noen tilfeller ønsker vi å foreta en CBCT-undersøkelse i tillegg til vanlig tannrøntgen. En slik undersøkelse sendes til vår radiolog som utarbeider et rapport som vi benytter i behandlingen. Kostnadene ved en CBCT-undersøkelse vil komme i tillegg til kostnadene ved en rotbehandling.

Mulige komplikasjoner:

Det å ha symptomer / smerter i noen dager etter det første besøket er ikke unormalt, og vi anbefaler en kombinasjon av ibux og paracetamol mot disse smertene.

I tenner med en infeksjon i roten kan smertene øke etter 2-3 dager, noen ganger kombinert med en hevelse og nedsatt allmenntilstand. Denne oppblussingen kaller vi for en «flare-up» og den behandles med antibiotika. Ta kontakt med klinikken så ordner vi en resept til det apoteket du ønsker.

Prognoser for rotbehandling:

I tenner uten infeksjon er prognosen god, studier viser en vellykkethet på opp mot 90%.

I tenner med infeksjon er prognosen noe lavere, opp mot 80%.

I rotfylte tenner med infeksjon er prognosen på 70-80%.

Dersom rotfyllingen ikke er vellykket, vil det noen ganger være nødvendig å gjøre en operasjon (rotspissamputasjon) på tannen. Et slikt inngrep vil medføre flere besøk og tilleggskostnader.

Våre priser:

Konsultasjon	2000 - 2 500kr
Konsultasjon m/CBCT (uten HELFO-refusjon)	3000kr
Tannrøntgen	190kr
Lokalbedøvelse	210kr
Rotbehandling av fortann	8 500 – 9 500kr
Rotbehandling av premolar	8 500 - 9 500kr
Rotbehandling av molar (jeksel)	10 500 - 11 500kr
Rotspissamputasjon av fortann / premolar	5 500kr
Rotspissamputasjon av molar (jeksel)	6 500kr

Ved rotbehandling vil et hygienetillegg på 160kr tilkomme per besøk.